

Sementi e Miscugli Foraggeri



Allseeds
High Quality


Cereal Silo

Miscuglio da erbaio Autunnale

Ciclo: Autunnale



Epoca di semina



Il periodo di semina è l'autunno, da metà ottobre a fine novembre.

Confezione: sacco 25 kg



dose 160-180 kg/ha



profondità 2-3 cm



semina a file

CARATTERISTICHE

Composizione

Triticale	40%
Frumento	30%
Avena tardiva	15%
Segale tardiva	15%



- ◇ **Medio tardivo**
- ◇ **Miscuglio equilibrato**
- ◇ **Senza controindicazioni ambientali**
- ◇ **Produttività elevata**
- ◇ **Foraggio appetibile**
- ◇ **Buon valore energetico**
- ◇ **Per insilato e/o fieno**

ADATTAMENTO E RESISTENZE



Si adatta alle più diverse condizioni pedologiche.
Ha una buona tolleranza alle malattie fungine



Utilizzato per produrre grandi quantità di insilato.
Può essere sfalcato ad inizio spigatura e pre-appassito
con successiva trinciatura o fasciatura

Sfalcio (inizio spigatura) ➔ Pre appassimento ➔ Trinciatura/Fasciatura ➔ Insilato di qualità

Valdastico Protein

Miscuglio da erbaio Autunnale

Ciclo: Autunnale



Epoca di semina



Il periodo di semina è l'autunno, da metà ottobre a metà novembre.

Confezione: sacco 25 kg



dose 140-150 kg/ha



profondità 2-3 cm



semina a file

CARATTERISTICHE

Composizione

Frumento for. (a)	30%
Frumento for. (b)	20%
Loietto (a)	5%
Loietto (b)	5%
Avena tardiva	20%
Triticale	20%



- ◇ Medio tardivo
- ◇ Miscuglio equilibrato
- ◇ Senza controindicazioni ambientali
- ◇ Produttività elevata
- ◇ Foraggio molto appetibile
- ◇ Buon tenore proteico
- ◇ Buon valore energetico
- ◇ Per insilato e/o fieno

ADATTAMENTO E RESISTENZE



Si adatta alle più diverse condizioni pedologiche.
Ottima resistenza ad allettamento
Ha una buona tolleranza alle malattie fungine



Utilizzato per produrre grandi quantità di insilato in raccolta diretta
Può essere sfalcato ad inizio spigatura e pre-appassito con successiva trinciatura o fasciatura

Sfalcio (inizio spigatura) ➔ Trinciatura ➔ Insilato di qualità
Sfalcio (inizio spigatura) ➔ Pre appassimento ➔ Trinciatura/Fasciatura ➔ Fieno di qualità


Super Silage

Miscuglio di Frumento foraggero e Triticale

Ciclo: Autunnale



Epoca di semina



Il periodo di semina è l'autunno, da metà ottobre a fine novembre.

Confezione: sacco 25 kg



dose 180-210 kg/ha



profondità 2-3 cm



semina a file

CARATTERISTICHE

Composizione

Triticale

51%

Frumento

49%



- ◇ **Ciclo medio**
- ◇ **Miscuglio equilibrato**
- ◇ **Senza controindicazioni ambientali**
- ◇ **Produttività assicurata**
- ◇ **Foraggio appetibile e digeribile**
- ◇ **Buon valore energetico**
- ◇ **Per insilato**

ADATTAMENTO E RESISTENZE



Si adatta alle più diverse condizioni pedologiche.

Ottima resistenza a Oidio, mal del piede, ruggine Gialla e Bruna



Utilizzato per produrre grandi quantità di insilato.
Viene raccolto con barre Direct Disc direttamente in campo

Sfalcio (*riempimento spiga*) ➔ Trinciatura ➔ Insilato di qualità

Speedy Milk

Miscuglio da erbaio Autunnale

Ciclo: Autunnale



Epoca di semina



Al nord il periodo di semina è l'autunno, da metà ottobre a metà novembre. Al Sud può essere seminato a partire da fine settembre.

Confezione: sacco 25 kg



dose 140-150 kg/ha



profondità 2-3 cm




semina a file

CARATTERISTICHE

Composizione

Avena	35%
Loglio westrwoldico	35%
Veccia sativa	15%
Trifoglio alessandrino	15%



- ◇ *Ciclo medio*
- ◇ *Alte rese produttive*
- ◇ *Ideale per ogni areale*
- ◇ *Buona essiccazione in fienagione*
- ◇ *Foraggio molto appetibile*
- ◇ *Buon tenore proteico*
- ◇ *Buon valore energetico*
- ◇ *Utilizzabile per foraggio fresco e/o fieno e anche per pascolo*

ADATTAMENTO E RESISTENZE



Si adatta alle più diverse condizioni pedologiche.
Ha una buona tolleranza alle malattie fungine



Utilizzato come foraggio verde e come fieno. Si presta al pascolo invernale se seminato tra settembre e novembre nelle zone del centro sud.

Sfalcio (inizio spigatura) ➔ Trinciatura ➔ Insilato di qualità
Pascolo ➔ Sfalcio ➔ Appassimento ➔ Raccolta/fasciatura ➔ Fieno di qualità

Sinfonia d'Autunno

Miscuglio da erbaio Autunnale

Ciclo: Autunnale



Epoca di semina



Semina da metà ottobre a fine novembre.
Al Sud e in Sardegna può essere seminato a partire da fine settembre a tutto dicembre.

Confezione: sacco 25 kg



dose 140-150 kg/ha



pro




semina a file

CARATTERISTICHE

Composizione

Triticale (1)	15%
Triticale (2)	20%
Loietto Tetraploide	25%
Frumento tenero (1)	20%
Frumento tenero (2)	20%



- ◇ **Medio tardivo**
- ◇ **Miscuglio appositamente studiato**
- ◇ **Senza controindicazioni ambientali**
- ◇ **Produttività elevata**
- ◇ **Insilato molto appetibile**
- ◇ **Ottimo valore energetico**
- ◇ **Per insilato**

ADATTAMENTO E RESISTENZE



È adatto alle più diverse condizioni pedologiche.
Buona tolleranza alle malattie fungine



Utilizzato per produrre grandi quantità di insilato.
Viene raccolto con barre Direct Disc direttamente in campo

Sfalcio (inizio spigatura) ➔ Insilato di qualità

Super Prato

Miscuglio da erbaio polifita

Ciclo: Poliennale



Epoca di semina



Il periodo di semina in autunno, da metà ottobre a metà novembre, in primavera da inizio marzo a metà aprile

Confezione: sacco 10 kg



dose 60-70 kg/ha



profondità 2-3 cm




semina a file

CARATTERISTICHE

Composizione

Loietto perenne	45%
Loietto italico	25%
Lupinella in guscio	15%
Fleolo pratense	5%
Erba mazzolina	5%
Tr. Pratense	2,5%
Tr. Repens	2,5%



- ◇ *Ripresa vegetativa anticipata*
- ◇ *Miscuglio equilibrato*
- ◇ *Rapido insediamento e ricaccio*
- ◇ *Produttività elevata*
- ◇ *Foraggio molto appetibile*
- ◇ *Buon tenore proteico*
- ◇ *Buon valore energetico*
- ◇ *Per pascolo e fieno*

ADATTAMENTO E RESISTENZE



Si adatta alle più diverse condizioni pedologiche.
Grandi capacità produttive
Ottima resistenza al calpestio



Utilizzato per produrre grandi quantità di fieno
Può essere sfalcato e pre-appassito con raccolta/fasciatura

Sfalcio ➔ Appassimento ➔ Raccolta/fasciatura ➔ Fieni di qualità

LE COVER CROPS

Le Cover Crops: Il "Motore Verde" del Suolo

Le cover crops (colture di copertura) sono colture erbacee inserite tra due colture principali.

Non si coltivano per il raccolto, ma per i servizi ecosistemici che offrono.

Perché evitare il terreno nudo?

Lasciare il suolo scoperto tra una semina e l'altra è un'inefficienza biologica che causa:

- **Perdita di energia:** Mancata conversione della luce solare in sostanza organica.
- **Erosione e Lisciviazione:** Pioggia e vento asportano particelle di suolo e nutrienti solubili (nitrati), inquinando le falde e impoverendo il campo.
- **Degradazione della Sostanza Organica:** Il terreno nudo e lavorato si "ossigena" troppo, accelerando la mineralizzazione dell'humus.

Funzioni principali

- **Catch Crops** (Colture di cattura): "Sequestrano" i nutrienti che andrebbero persi, restituendoli al ciclo biologico.
- **Sovescio:** Aumento della fertilità tramite l'interramento della biomassa verde.
- **Controllo Infestanti:** Molte specie (es. segale) esercitano un'azione allelopatica, inibendo chimicamente la crescita delle malerbe.
- **Greening:** Rispetto dei vincoli ambientali previsti dalle politiche agricole UE (PAC).

La Gestione Moderna, oggi la tendenza è ridurre al minimo le lavorazioni profonde:

- **Mantenimento dei residui:** Lasciare i resti della coltura precedente miscelati in superficie per proteggere il suolo.
- **Terminazione meccanica:** Utilizzo del **Roller Crimper** (rullo sagomato) per abbattere la cover crop creando una pacciamatura naturale, evitando il diserbo chimico.
- **Semina su sodo:** Seminare la coltura principale direttamente sui residui della cover crop per preservare la struttura e l'umidità del terreno.

Le cover crops consentono, nel periodo di non coltivazione, di intercettare la radiazione solare e catturando gli elementi nutritivi migliorano l'efficienza dell'ecosistema. Un ecosistema efficiente richiede meno concimazioni per produrre riducendo i costi di coltivazione.

La cover crop deve avere un buon sviluppo della biomassa prima della terminazione riducendo la durata del periodo in cui il suolo resta nudo. Nelle monocolture dei cereali a semina autunnale si adattano bene cover crop con cicli primaverili-estivi molto brevi, adattate a stress idrici per evitare interventi irrigui, come ad esempio: sorgo, loiessa, trifoglio, panico. Nelle colture a semina primaverile, i migliori sono cover crop con cicli autunno-vernini

costituiti da graminacee, brassicacee, leguminose, come ad esempio: loiessa, segale, avena, frumento tenero, triticale, veccia, pisello proteico, pisello foraggero, colza foraggera, ecc.




In sintesi: Passare dal concetto di "terreno a riposo" a quello di "terreno sempre vivo" è la chiave per ridurre i costi di concimazione e migliorare la resilienza climatica dell'azienda agricola.

Super Cover

Miscuglio da Cover Crops

Ciclo: Autunnale primaverile precoce

Epoca di semina



Il periodo di semina da inizio novembre a metà marzo, anche dopo mais per favorire la copertura del terreno

Confezione: sacco 25 kg



dose 140-150 kg/ha



profondità 3-4 cm



semina a file

CARATTERISTICHE

Composizione

Pisello foraggero	40%
Veccia	30%
Avena	15%
Orzo alternativo	15%



- ◇ **Ciclo medio**
- ◇ **Per tutti gli ambienti del nord e del sud Italia**
- ◇ **Adatto a diverse condizioni pedoclimatiche**
- ◇ **Apporti importanti di elementi azotati**
- ◇ **Ristrutturante del terreno**

ADATTAMENTO E RESISTENZE



Forte capacità di adattamento e di copertura del terreno. Miscela adatta per apportare notevoli quantità di azoto disponibile al suolo.



Per utilizzare il periodo di tempo che intercorre tra una coltura e l'altra ed ottenere un apporto consistente di sostanza organica.

Trinciatura ➔ Interramento

Autumn Cover

Miscuglio Cover Crops per arricchimento sostanza organica

Ciclo: Autunnale



Epoca di semina



Il periodo di semina è l'autunno, inizio ottobre a metà novembre.

Confezione: sacco 25 kg



dose 140-150 kg/ha



profondità 2-3 cm




semina a file

CARATTERISTICHE

Composizione

Avena	35%
Frumento tenero	45%
Veccia	16%
Facelia	4%



- ◇ **Ciclo precoce**
- ◇ **Per gli ambienti del nord e del sud Italia**
- ◇ **Adatto ai diversi tipi di terreno**
- ◇ **Apporti importanti di sostanza organica**
- ◇ **Ristrutturante del terreno**

ADATTAMENTO E RESISTENZE



Forte capacità di adattamento e di copertura del terreno. Miscela adatta per ristrutturare il suolo.



Per utilizzare il periodo di tempo che intercorre tra una coltura e l'altra ed ottenere un apporto consistente di sostanza organica.

Trinciatura ➔ Interramento



Miscugli Sottovigneto

In agricoltura, il concetto di **Miscugli Sottovigneto** (o inerbimento dell'interfila) si è evoluto drasticamente negli ultimi anni. Non si parla più di semplice "erba che cresce", ma di una vera e propria tecnologia agronomica per contrastare il cambiamento climatico e migliorare la qualità del vino.

Il passaggio da erbaio qualsiasi ai "Miscugli Funzionali"

Oggi non si semina più un miscuglio generico, ma si pensa un tappeto erboso in base agli obiettivi della cantina:

- **Contenimento della vigoria:** si usano graminacee a crescita lenta (come la *Festuca ovina*) che competono per l'acqua e l'azoto.
- **Apporto di nutrienti (Sovescio):** Si utilizzano leguminose (trifogli) capaci di fissare l'azoto atmosferico e rilasciarlo nel terreno dopo lo sfalcio o l'allettamento.
- **Controllo dell'erosione:** In vigneti collinari, si scelgono specie con apparati radicali fascicolati molto fitti per trattenere il suolo durante le bombe d'acqua.



Tecno Vigneto - Collinare

Miscuglio da inerbimento

Ciclo: Autunno primaverile



Epoca di semina



Il periodo di semina da fine settembre a tutto ottobre e da fine febbraio a fine marzo

Confezione: sacco 10 kg



dose 60-80 kg/ha



profondità 2-3 cm



semina a file

CARATTERISTICHE

Composizione

<i>Lolium perenne</i>	40%
<i>Festuca rubra</i>	30%
<i>Poa pratense</i>	15%
<i>Tr. repens</i>	15%



- ◇ Consociazione equilibrata
- ◇ Basso sviluppo vegetativo
- ◇ Ridotta competitività
- ◇ Resistente al calpestamento dei mezzi
- ◇ Ridotto numero di sfalci
- ◇ Riduzione consistente delle infestanti
- ◇ Rientra nei prodotti utilizzabili per l'Ecoschema 2 – Pac 2023-2027

ADATTAMENTO E RESISTENZE



Adatto ad ambienti temperati di medio alta collina ben drenanti.
Il miscuglio tollera il calore intenso.



L'inerbimento è una pratica utilizzata per creare un tappeto erboso per ridurre l'erosione in ambienti collinari ma anche per avere piccole ma interessanti quantità di sostanze nutritive


Tecno Vigneto - Pianura

Miscuglio da inerbimento

Ciclo: Autunno primaverile



Epoca di semina



Il periodo di semina è da fine settembre a tutto ottobre e da fine febbraio a fine marzo.

Confezione: sacco 10 kg



dose 60-80 kg/ha



profondità 2-3 cm



semina a file

CARATTERISTICHE

Composizione

Lolium perenne 45%

Festuca arundinacea 45%

Poa pratense 10%



- ◇ *Consociazione equilibrata*
- ◇ *Basso sviluppo vegetativo*
- ◇ *Ridotta competitività*
- ◇ *Resistente al calpestamento dei mezzi*
- ◇ *Ridotto numero di sfalci*
- ◇ *Riduzione consistente delle infestanti*
- ◇ *Rientra nei prodotti utilizzabili per l'Ecoschema 2 – Pac 2023-2027*

ADATTAMENTO E RESISTENZE



Rapida copertura, con essenze a taglia bassa, per terreni di pianura più o meno fertili ma drenanti. Per assicurare e tollerare il passaggio dei mezzi agricoli.



L'inerbimento è una pratica utilizzata per creare un tappeto erboso per ridurre l'erosione in ambienti collinari ma anche per avere piccole ma interessanti quantità di sostanze nutritive

Vanda

Erba medica

Semi dormiente



Epoca di semina



Il periodo di semina è:
in autunno, da fine agosto a fine ottobre
in primavera, da fine febbraio fine marzo
Confezione: sacco 10 kg



dosi

seme nudo 35-40 kg/ha

seme pellicolato 40-45 kg/ha



profondità 2-3 cm



semina a file

CARATTERISTICHE:

Ricaccio veloce

Multifogliata

Stelo cavo per essiccazione rapida

Semi dormiente per resistere al freddo

- Per la produzione di fieno, insilati e pellets
- Valida in ogni ambiente vocato
- Resistente alle fitopatie
- Fibra molto digeribile
- Ottimo il contenuto proteico
- Buona resistenza al freddo
- Rapida essiccazione

RFV

(Relative Feed Value)

Standard 110

Buona 150

Vanda 170

ADATTAMENTO E RESISTENZE



**Adatta ai terreni profondi, argillosi o di medio impasto.
Ottima in ogni caso la longevità.
Buona resistenza a Phytophthora, Fusarium**




Per produrre grandi quantità di foraggio ad alto tenore proteico, per l'utilizzo nella produzione di pellets o anche come insilato.

Sfalcio (inizio fioritura) ➔ Pre appassimento ➔ Trinciatura/Fasciatura ➔ Insilato di qualità
Sfalcio (inizio fioritura) ➔ Appassimento ➔ Essiccazione ➔ Imballo ➔ Fieno di qualità

ALS M68

Erba medica

Semi dormiente



Epoca di semina



Il periodo di semina è:
in autunno, da fine agosto a fine ottobre
in primavera, da fine febbraio fine marzo
Confezione: sacco 10 kg



dosi

seme nudo 35-40 kg/ha
seme pellicolato 40-45 kg/ha



profondità 2-3 cm



semina a file

CARATTERISTICHE:

Rapidità di ricaccio dopo il taglio
Semi dormiente per zone fredde
Alta percentuale di multifoglie
Stelo elastico non fibroso

- Per la produzione di fieno, insilati e pellets
- Resistente al freddo anche intenso
- Alta digeribilità
- Utilizzabile per il pascolamento
- Buono il contenuto proteico
- Si esalta in terreni profondi
- Molto buona la longevità

RFV

(Relative Feed Value)

Standard 110

Buona 150

ALS M68 180

ADATTAMENTO E RESISTENZE



**Adatta ai terreni profondi, argillosi o di medio impasto.
Ottima in ogni caso la longevità.
Buona resistenza a Phytophthora, Fusarium e Rhizoctonia**




Per produrre grandi quantità di foraggio ad alto tenore proteico, per l'utilizzo nella produzione di pellets o anche come insilato.

Sfalcio (inizio fioritura) ➔ Pre appassimento ➔ Trinciatura/Fasciatura ➔ Insilato di qualità
Sfalcio (inizio fioritura) ➔ Appassimento ➔ Essiccazione ➔ Imballo ➔ Fieno di qualità


Mustela

Lolium multiflorum Diploide

Ciclo medio tardivo



Epoca di semina



Il periodo di semina ideale va da fine settembre a metà novembre poi si semina entro il mese di febbraio

Confezione: sacco 25 kg



dosi seme nudo 40/45 kg/ha



profondità 2-3 cm



semina a file

CARATTERISTICHE:

Insediamiento rapido garantito

Produzione elevata e costante di foraggio

Elevata resistenza ad allettamento e malattie

Alta densità di culmi

- Per fieno, pascolo invernale, foraggio verde
- Resistente al freddo anche intenso
- Alta digeribilità
- Utilizzabile per il pascolamento
- Resistente al marciume del colletto
- Rapidità di ricaccio per ottenere più tagli
- Rapidità di essiccazione e/o pre-appassimento

ADATTAMENTO E RESISTENZE



Adatta ai diversi tipi di terreno con ottima rapidità di copertura del suolo

Resistente al marciume del colletto (*Rhizoctonia* e *Sclerotinia*).



Per produrre grandi quantità di foraggio come fieno, fasciato e insilato ad alta appetibilità e digeribilità.

Sfalcio (inizio spigatura) ➔ Pre appassimento ➔ Trinciatura/Fasciatura ➔ Insilato di qualità
Sfalcio (inizio fioritura) ➔ Appassimento ➔ Essiccazione ➔ Imballo ➔ Fieno di qualità


Levonet

Lolium multiflorum Tetraploide

Ciclo medio tardivo



Epoca di semina



Il periodo di semina ideale va da fine settembre a metà novembre poi si semina entro il mese di febbraio

Confezione: sacco 25 kg



dosi seme nudo 40/45 kg/ha



profondità 2-3 cm



semina a file

CARATTERISTICHE:

Insediamiento rapido garantito

Ottime prestazioni in tutti gli ambienti

Spigatura e fioritura lenta

Stelo robusto e flessibile

- Per fieno, pascolo invernale, foraggio verde
- Resistente al freddo anche intenso
- Alta digeribilità
- Utilizzabile per il pascolamento
- Resistente al marciume del colletto
- Rapidità di ricaccio per ottenere più tagli
- Rapidità di essiccazione e/o pre-appassimento

ADATTAMENTO E RESISTENZE



Adatta ai diversi tipi di terreno Indicato per tutti gli agricoltori che desiderano alte produzioni senza l'assillo della veloce spigatura.

Resistente al marciume del colletto (*Rhizoctonia* e *Sclerotinia*) .



Per produrre grandi quantità di foraggio come fieno, fasciato e insilato ad alta appetibilità e digeribilità.

Sfalcio (*inizio spigatura*) ➔ Pre appassimento ➔ Trinciatura/Fasciatura ➔ Insilato di qualità
Sfalcio (*inizio fioritura*) ➔ Appassimento ➔ Essiccazione ➔ Imballo ➔ Fieno di qualità



Allseeds





High Quality



Allseeds

High Quality

Sede legale: via Terraglio 68/A - 31100 Treviso

Sede operativa: via Cà Losca 8 - 36040 Orgiano

www.allseeds.org e-mail: info@allseeds.it

Uffici commerciali: 0444-781092

